

# Instrucciones de Medicación Despues de la Cirugía

## 1. AMOXICILINA O CLINDAMYCIN (Antibiótico)

Tome la primera dosis lo antes posible después de la cirugía. Completar todo.



## 2. IBUPROFENO (Aalgésico/Antiinflamatorio)

Tome la primera dosis lo antes posible después de la cirugía. Tomar cada 6 horas según sea necesario para el dolor.

## 3. TYLENOL: DE VENTA LIBRE (Aalgésico/Antiinflamatorio)

Se ha demostrado que el Tylenol (acetaminofén), tomado en combinación con ibuprofeno, brinda un excelente control del dolor, comparable a los opioides. Alterne entre ibuprofeno y Tylenol cada 3 horas.

**RÉGIMEN:** Tome una dosis de 600mg de ibuprofeno, 3 horas después tome una dosis de 500-650mg de Tylenol, 3 horas más tarde tome otra dosis de 600mg de ibuprofeno, 3 horas más tarde tome otra dosis de 500-650 mg de Tylenol. Continúe según sea necesario. No tome más de 2600 mg de Tylenol en 24 horas.

## 4. PERIDEX (Enjuague bucal antimicrobiano)

- **EL DÍA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA:** Haga enjuages suavemente alrededor de las áreas quirúrgicas 2-3 veces al día. **No pasarl o tomarsela.**
- **COMENZANDO EL DÍA 4:** Use el enjuague en la jeringa provista para enjuagar suavemente los sitios quirúrgicos 2 veces al día.
- **EVITE** usar la jeringa en los primeros 3 días, lo que puede alterar la coagulación de la sangre y causar un **ALVIO SECO**.

## 5. OXYCODONE (Aalgésico más fuerte - Opioide)

**NO TOME** este medicamento inmediatamente después de la cirugía. Puede interactuar con los medicamentos sedantes que todavía están en su sistema. Solo tome este medicamento si el ibuprofeno/Tylenol por sí solo no proporciona un control adecuado del dolor. Si siente que lo necesita, espere hasta la NOCHE del día de la cirugía para tomar su primera dosis.

**NO LO TOME** antes de conducir o si va a operar maquinaria pesada.

## 6. MEDROL DOSE PACK (Corticoesteroide – controla la hinchazón/inflamación)

Comience el DÍA DESPUÉS de la cirugía. Siga exactamente las instrucciones del paquete.